

BIOBADAGUAY - REVISIÓN ANUAL

Nombre:

Fecha de revisión:

Fármaco actual:

Vía de administración: Vía IV Vía Subcutánea

Dosis (en mg):

Periodicidad (en semanas):

En caso de Artritis reumatoide o artritis psoriásica:

Número de articulaciones dolorosas (máximo 28):

Número de articulaciones tumefactas (máximo 28):

Escala visual analógica del paciente (0-10 en cm):

Velocidad de sedimentación (VSG):

Proteína C reactiva (PCR):

mg/l mg/dl otras unidades desconocido

DAS28 referido:

El dato del DAS28 proporcionado se refiere a:

PCR VSG

Observaciones DAS 28 basal:

En caso de Espondilitis anquilosante o Artritis psoriásica con manifestación axial:

BASDAI:

ASDAS-PCR:

En caso de Lupus eritematoso:

SLEDAI:

Para todos los pacientes

Factor reumatoide:

positivo negativo Indeterminado

Valor del factor reumatoide (unidades/ml):

Anti-CCP:

positivo negativo Indeterminado

Valor anti-CCP (unidades/ml):

peso del paciente /kg):

Tratamiento concomitante

Metotrexato Dosis (mg/semana): Vía oral Vía parenteral

Antipalúdicos

Azatioprina

Ciclofosfamida

Ciclosporina

Denosumab

Glucocorticoides Dosis (mg/día)

Leflunomida

Mesalazina

Micofenolato Mofetil

Sales de oro

Sulfasalazina

Tacrolimus